

刺五加一新变种

谷淑芬 李长海 门玉岑

A NEW VARIETY OF ACANTHOPANAX SENTICUSUS

Gu Shu-fen Li Chang-hai Men Yu-cen

〔摘 要〕 本文发表刺五加一新变种:短蕊刺五加 *Acanthopanax senticusus* (Rupr. et Maxim.) Harms var. *brevistaminea* S. F. Gu, var. nov.

关键词 五加属; 短蕊刺五加

Key words *Acanthopanax*; *Acanthopanax senticusus* Harms var. *brevistaminea*

短蕊刺五加 新变种 图

Acanthopanax senticusus (Rupr. et Maxim.) Harms var. *brevistaminea* S. F. Gu, var. nov.

A var. *senticusus* differt aculeis crassioribus in ramulis annuis; foliolis saepe 3, raro 4—5, crassioribus, supra dense strigosis, subtus pubescentibus, secus nervos densioribus; petiolis sine aculeis, sparse pubescentibus vel glabris; petalis erectis, caducis, staminibus petalis brevioribus, antheris roseo-albis; florescentia primotiniore, fine junii—initio julii florens

Heilongjiang: Harbin, Heilongjiang Arboretum, cult., Jul. 25, 1987. Gu Shu-fen 2, (Typus in Herb. Heilongjiang Arboretum conserv.); Shang zhi, Jul. 15, 1991 Li Chang-hai 91026.

本变种与原变种不同, 在于一年生枝上的刺较粗; 小叶通常 3 枚, 稀 4—5, 质较厚, 上面密被糙伏毛, 下面被柔毛, 脉上毛较密; 叶柄无刺, 无毛或疏生柔毛; 花瓣直立, 早落, 雄蕊短于花瓣, 花药粉白色; 花期较早, 六月下旬至七月初开花。原变种一年生枝上的刺较细长向下; 小叶通常 5 枚, 稀 4 或 3 小叶, 质较薄, 上面散生小糙毛或近无毛, 下面沿脉密生褐色毛和细刺; 叶柄散生细刺或近无刺; 花瓣反卷, 雄蕊较花瓣长, 超出花瓣, 花药白色; 花期较晚, 七月中旬至下旬开花。

黑龙江: 哈尔滨, 黑龙江省森林植物园, 栽培, 1987年7月25日。谷淑芬 2 号, (模式标本存黑龙江省森林植物园标本室)。尚志, 老街基, 1991年7月15日。李长海 91026。

本文作者单位: 黑龙江、哈尔滨, 黑龙江省森林植物园 (Heilongjiang Arboretum, Harbin, 150040 Heilongjiang)。

本研究得到黄普华教授指导和帮助, 在此表示感谢!

1992年10月收到本文。




图 短蕊刺五加 *Acanthopanax senticosus* var. *brevistaminea*

1. 花枝；2. 放大的花。